

ANEXO III - Descrição das espécies selecionadas

Nome Popular	Porte	Família	Nome Científico	Autor	Crescimento	Origem
Açoita-cavalo	Grande	MALVACEAE	<i>Luehea divaricata</i>	Mart. & Zucc.	Médio	nativa
Aldrago	Médio	FABACEAE	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Vahl.	Médio	ex-FES PR
Alecrim-de-campinas	Médio	FABACEAE	<i>Holocalyx balansae</i>	Micheli	Lento	ex-FES PR
Araçá	Pequeno	MYRTACEAE	<i>Psidium cattleianum</i>	Sabine	Lento	nativa
Árvore-sambaíba	Pequeno	SAPINDACEAE	<i>Filicium decipiens</i>	(Wight & Arn.) Thwaites	Médio	ex-BR
Bisnagueira	Grande	BIGNONIACEAE	<i>Spathodea campanulata</i>	P. Beauv.	Médio	ex-BR
Bucha-de-copo	Médio	MYRTACEAE	<i>Callistemon viminalis</i>	G. Don ex Loud	Lento	ex-BR
Cabreúva	Médio	FABACEAE	<i>Myroxylon peruiferum</i>	L. F	Lento	nativa
Café-de-bugre	Médio	BORAGINACEAE	<i>Cordia ecalyculata</i>	Vell	Médio	nativa
Canafístula	Grande	FABACEAE	<i>Peltophorum dubium</i>	(Spreng.) Taub.	Rápido	nativa
Canelinha	Médio	LAURACEAE	<i>Nectandra megapotamica</i>	(Spreng.) Mez	Médio	nativa
Capixingui	Médio	EUPHORBIACEAE	<i>Croton floribundus</i>	Spreng	Rápido	nativa
Cássia-javanica	Médio	FABACEAE	<i>Cassia javanica</i>	L.	Rápido	ex-BR
Cássia-Rosa	Grande	FABACEAE	<i>Cassia grandis</i>	L. f.	Lento	ex-FES PR
Cedro	Grande	MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i>	Vell	Médio	nativa
Cereja-rio-grande	Pequeno	MYRTACEAE	<i>Eugenia involucrata</i>	DC.	Lento	nativa
Cerejeira-do-japão	Médio	ROSACEAE	<i>Prunus serrulata</i>	Lindl.	Lento	ex-BR
Dedaleiro/Mirindiba	Médio	LYTHRACEAE	<i>Lafoensia glyptocarpa</i>	Koehne	Médio	ex-FES PR
Falso-barbatimão	Médio	FABACEAE	<i>Cassia leptophylla</i>	Vog.	Rápido	ex-FES PR
Farinha-seca	Grande	FABACEAE	<i>Albizia niopoides</i>	(Spruce ex Benth.) Burkart	Rápido	nativa
Faveiro, Sucupira	Médio	FABACEAE	<i>Pterodon emarginatus</i>	Vog.	Lento	ex-FES PR
Feijão-cru	Médio	FABACEAE	<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i>	(Hassl.) M.J. Silva e A.M.G Azevedo	Médio	nativa
Figueira	Grande	MORACEAE	<i>Ficus guaranitica</i>	Chodat	Lento	nativa
Flamboyant	Médio	FABACEAE	<i>Delonix regia</i>	(Bojer ex Hook.) Raf.	Rápido	ex-BR
Grevílea	Médio	PROTEACEAE	<i>Grevillea robusta</i>	A. Cunn. ex R. Br.	Rápido	ex-BR
Grumixama	Pequeno	MYRTACEAE	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Lam.	Lento	nativa
Guabiroba	Pequeno	MYRTACEAE	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	(Mart.) O.Berg	Lento	nativa
Guajuvira	Grande	BORAGINACEAE	<i>Cordia americana</i>	(L.) Gottschling & J.S.Mill.	Médio	nativa
Guaritá	Grande	ANACARDIACEAE	<i>Astronium graveolens</i>	Jacq.	Lento	nativa
Ingá	Médio	FABACEAE	<i>Inga marginata</i>	Willd.	Rápido	nativa
Ipê-amarelo	Médio	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	(Mart. ex DC.)	Lento	ex-FES PR
Ipê-branco	Pequeno	BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia roseoalba</i>	(Ridl.) Sandwith	Lento	nativa
Ipê-rosa	Grande	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	(Mart. ex DC.) Mattos	Lento	nativa
Ipê-roxo	Grande	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	(Vell.) Mattos	Lento	nativa
Jacarandá-caroba	Médio	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda macrantha</i>	Cham.	rápido	nativa
Jacarandá-da-bahia	Grande	FABACEAE	<i>Dalbergia nigra</i>	(Vell.) Allemão ex Benth.	Lento	nativa
Jacarandá-mimoso	Médio	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	D. Don	Rápido	ex-BR
Jacarandá-rosa	Médio	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda micrantha</i>	Cham	Médio	nativa
Jatobá	Grande	FABACEAE	<i>Hymenaea courbaril</i>	L. var. stilbocarpa (Hayne) Lee et Lang.	Lento	nativa
Jequitibá-rosa	Grande	LECYTHIDACEAE	<i>Cariniana estrellensis</i>	(Raddi) Kuntze	Médio	nativa
Jerivá	Médio	ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	(Cham.) Glassman	Rápido	Nat

ANEXO III - Descrição das espécies selecionadas

Nome Popular	Porte	Família	Nome Científico	Autor	Crescimento	Origem
Louro-pardo	Médio	BORAGINACEAE	<i>Cordia trichotoma</i>	(Vell.) Arráb. ex Steud.	Médio	nativa
Manacá-da-serra	Pequeno	MELASTOMATAACEAE	<i>Pleroma mutabile</i>	(Vell.) Triana	Médio	ex-FES PR
Melaleuca	Grande	MYRTACEAE	<i>Melaleuca leucandendron</i>	L.	Lento	ex-BR
Óleo-copaiba	Médio	FABACEAE	<i>Copaifera langsdorffii</i>	Desf.	Lento	nativa
Paineira	Grande	MALVACEAE	<i>Ceiba speciosa</i>	(St.-Hill.) Ravenna	Médio	nativa
Palmeira-azul	Médio	ARECACEAE	<i>Bismarckia nobilis</i>	Hildebrandt & H. Wendl.	Médio	ex-BR
Palmeira-carpentaria	Pequeno	ARECACEAE	<i>Carpentaria acuminata</i>	(H. Wendl. & Drude) Becc ., Ann. Jard	Rápido	ex-BR
Palmeira-elegance	Médio	ARECACEAE	<i>Ptychosperma elegans</i>	(H.Wendl. & Drude) Kuntze	Médio	ex-BR
Palmeira-imperial	Grande	ARECACEAE	<i>Roystonea oleracea</i>	(Jacq.) O.F. Cook	Médio	ex-FES PR
Palmeira-rabo-de-peixe	Médio	ARECACEAE	<i>Caryota urens</i>	Jacq.	Rápido	ex-BR
Palmeira-real-australiana	Médio	ARECACEAE	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	H. Wendl e Drude	Rápido	ex-BR
Pau-brasil	Médio	FABACEAE	<i>Paubrasilia echinata</i>	(Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	Lento	ex-PR
Pau-de-mulato	Grande	RUBIACEAE	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	(Benth.) K.Schum.	Lento	ex-FES PR
Pau-ferro	Grande	FABACEAE	<i>Libidibia ferrea</i>	(Mart. Ex Tul.) L.P.Queiroz	Lento	ex-PR
Peroba	Grande	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Müll. Arg.	Lento	nativa
Pitanga	Pequeno	MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i>	L.	Lento	nativa
Quaresmeira	Médio	MELASTOMATAACEAE	<i>Pleroma granulosum</i>	(Desr.) D. Don	Médio	nativa
Resedá	Pequeno	LYTHRACEAE	<i>Lagerstroemia indica</i>	(L.) Pers	Médio	ex-BR
Sapuva	Médio	FABACEAE	<i>Machaerium stipitatum</i>	Vogel	Médio	nativa
Sibipiruna	Médio	FABACEAE	<i>Poincianella pluviosa</i>	(DC.) L.P.Queiroz	Rápido	ex-PR
Tamareira	Médio	ARECACEAE	<i>Phoenix dactylifera</i>	L.	Lento	ex-BR
Tarumã	Médio	LAMIACEAE	<i>Vitex polygama</i>	Cham.	Lento	nativa
Tipuana	Médio	FABACEAE	<i>Tipuana tipu</i>	(Benth.) Kuntze	Rápido	ex-BR
Uvaia	Médio	MYRTACEAE	<i>Eugenia pyriformis</i>	Cambess.	Lento	nativa

ANEXO III - Descrição das espécies selecionadas

Nome Popular	Espaçamento Ideal (m)	Tronco Paisagístico	Cor da Flor	Intensidade Floração	Época de Floração	Época de Frutificação	Valor Madeireiro	Calçada Estreita (< 2 m)	Calçada Padrão (2,5 até 3 m)
Açoita-cavalo	14 até18		Rosa	Média	Dez-Jan	Maio-Ago	Baixo		*
Aldrigo	12 até 16		Amarela	Alta	Out-Dez	Maio-Jul	Baixo		*
Alecrim-de-campinas	12 até 16	*	Branca	Baixa	ago-out	Dez-Fev	Médio		*
Araçá	8 até 10		Branca	Baixa	Ago-Out		Baixo	*	
Árvore-samambaia	8 até 10		Branca	Baixa	Nov-Dez		Baixo	*	*
Bisnagueira	14 até18		Vermelha	Alta	Set-Dez	Nov-Mar	Baixo		
Bucha-de-copo	12 até 16		Vermelha	Alta	Set-Out		Baixo	*	*
Cabreúva	12 até 16		Branca	Baixa	ago-set	Out-Nov	Baixo		*
Café-de-bugre	12 até 16		Branca	Baixa	ago-set	Jan-Mar	Baixo		*
Canafístula	14 até18		Amarela	Alta	Dez-Fev	Mar-Abr	Baixo		*
Canelinha	12 até 16		Branca	Baixa	abr-out	Nov-Jan	Baixo		*
Capixingui	12 até 16		Branca	Baixa	set-out	Jan-Fev	Baixo		*
Cássia-javanica	12 até 16		Rosa	Alta	Set-Out		Baixo		*
Cássia-Rosa	14 até18		Rosa	Alta	Ago-Nov	Ago-Set	Baixo		
Cedro	14 até18	*	Branca	Baixa	jun-jul	Jun-Ago	Médio		
Cereja-rio-grande	8 até 10		Branca	Baixa	Set-Out		Baixo	*	*
Cerejeira-do-japão	12 até 16		Rosa	Alta	Jul-Set		Baixo	*	*
Dedaleiro/Mirindiba	12 até 16		Branca	Alta	Jun-Ago	Set-Nov	Baixo		*
Falso-barbatimão	12 até 16		Amarela	Alta	Nov-Jan	Jun-Jul	Baixo		*
Farinha-seca	14 até18	*	Creme	Média	Out-Jan	Set-Out	Baixo		*
Faveiro, Sucupira	12 até 16		Rosa	Alta	Set-Out	Jun-Jul	Baixo		*
Feijão-cru	12 até 16		Roxa	Média	Out-Jan	Jul-Ago	Baixo		*
Figueira	14 até18	*	Rosa	Baixa	jun-set	Dez-Jan	Baixo		
Flamboyant	12 até 16	*	Vermelha	Alta	Out-Dez		Baixo		
Grevílea	12 até 16		Amarela	Média	Set-Nov		Baixo		
Grumixama	8 até 10		Branca	Baixa	Set-Out		Baixo	*	*
Guabiroba	8 até 10	*	Branca	Média	Set-Out	Nov-Dez	Baixo	*	*
Guajuvira	14 até18		Creme	Baixa	set-nov	Nov-Dez	Baixo		*
Guaritá	14 até18	*	Branca	Média	Ago-Set	Out-Nov	Alto		*
Ingá	12 até 16		Branca	Média	ago-set		Médio		*
Ipê-amarelo	12 até 16		Amarela	Alta	Ago-Set	Set-Out	Baixo		*
Ipê-branco	8 até 10		Branca	Alta	Ago-Out	Out-Nov	Baixo		*
Ipê-rosa	14 até18		Rosa	Alta	Maio-Ago	Set-Out	Médio		*
Ipê-roxo	14 até18		Rosa	Alta	Jun-Ago	Ago-Nov	Médio		*
Jacarandá-caroba	12 até 16		Roxa	Baixa	Nov-Fev	Abr-Jun	Médio		*
Jacarandá-da-bahia	14 até18		Creme	Média	nov-dez		Médio		*
Jacarandá-mimoso	12 até 16		Roxa	Alta	Ago-Out	Out-Nov	Baixo		*
Jacarandá-rosa	12 até 16		Rosa	Alta	Out-Dez	Jul-Set	Baixo		*
Jatobá	14 até18	*	Branca	Baixa	jan	Jun-Jul	Médio		
Jequitibá-rosa	14 até18		Branca	Média	Out-Dez	Jul-Set	Médio		
Jerivá	8 até 10		Amarela	Baixa	Jan	Jan-Abr-Mai-Out	Baixo		

ANEXO III - Descrição das espécies selecionadas

Nome Popular	Espaçamento Ideal (m)	Tronco Paisagístico	Cor da Flor	Intensidade Floração	Época de Floração	Época de Frutificação	Valor Madeiro	Calçada Estreita (< 2 m)	Calçada Padrão (2,5 até 3 m)
Louro-pardo	12 até 16		Creme	Média	Abr-Jul	Jul-Set	Baixo		*
Manacá-da-serra	8 até 10		Rosa	Alta	Nov-Fev	Fev-Mar	Baixo	*	
Melaleuca	14 até 18	*	Branca	Média	set-nov		Baixo		*
Óleo-copaiba	12 até 16	*	Branca	Baixa	out-dez	Ago-Set	Baixo		*
Paineira	14 até 18	*	Rosa	Alta	Nov-Abr	Ago-Set	Baixo		
Palmeira-azul	12 até 16		Marrom	Baixa	set-nov		Baixo		
Palmeira-carpentaria	5 até 8	*	Creme	Baixa			Baixo		
Palmeira-elegance	8 até 10	*	Vermelha	Baixa	jun-jul		Baixo		
Palmeira-imperial	14 até 18	*	Branca	Baixa	set-dez		Baixo		
Palmeira-rabo-de-peixe	12 até 16		Amarela	Baixa			Baixo		
Palmeira-real-australiana	8 até 10	*	Creme	Baixa			Baixo		
Pau-brasil	12 até 16		Amarela	Alta	Set-Out	Nov-Jan	Médio		*
Pau-de-mulato	14 até 18	*	Branca	Média	Jun-Jul	Ago-Nov	Alto		
Pau-ferro	14 até 18	*	Amarela	Média	Nov-Fev	Jul-Set	Médio		*
Peroba	14 até 18	*	Branca	Baixa	Out-Nov	Ago-Set	Alto		
Pitanga	8 até 10		Branca	Baixa	set-out	Out-Jan	Baixo	*	*
Quaresmeira	12 até 16		Roxa	Alta	Jun-Mar	Dez-Mar	Baixo		*
Resedá	8 até 10		Rosa	Alta	out-fev		Baixo	*	*
Sapuva	12 até 16		Branca	Baixa	dez-mai	Set-Out	Baixo		*
Sibipiruna	12 até 16		Amarela	Alta	Ago-Nov	Jul-Set	Baixo		*
Tamareira	12 até 16	*	Vermelha	Média	set- nov		Baixo		
Tarumã	12 até 16		Azul	Baixa	out	Jan-Abr	Médio		*
Tipuana	12 até 16	*	Amarela	Média	Set-Out		Baixo		*
Uvaia	8 até 10		Branca	Baixa	ago-set	Nov -Dez	Baixo	*	*

ANEXO III - Descrição das espécies selecionadas

Nome Popular	Calçada Ampla (> 3 m)	Canteiro Central Amplo (> 3 m)	Canteiro Central Estreito (< 3 m)	Praças	Embaixo de Fiação	Sem Fiação	Via Extensa	Via Curta
Açoita-cavalo	*			*	*	*		*
Aldrago	*	*		*	*	*	*	
Alecrim-de-campinas	*	*		*	*	*	*	
Araçá				*	*			*
Árvore-samambaia	*		*	*	*		*	*
Bisnagueira	*	*		*		*		*
Bucha-de-copo	*				*	*		
Cabreúva	*	*		*	*	*	*	
Café-de-bugre	*			*		*		*
Canafístula	*	*		*	*	*		*
Canelinha	*					*		*
Capixingui				*		*		*
Cássia-javanica						*	*	
Cássia-Rosa	*	*		*		*	*	
Cedro	*	*		*		*		*
Cereja-rio-grande				*	*			*
Cerejeira-do-japão	*		*	*	*	*		*
Dedaleiro/Mirindiba	*			*	*	*	*	
Falso-barbatimão	*			*	*	*	*	*
Farinha-seca	*	*				*		*
Faveiro, Sucupira	*		*	*	*	*		*
Feijão-cru	*	*		*	*	*	*	
Figueira		*				*	*	
Flamboyant		*		*		*	*	
Grevílea			*	*		*	*	
Grumixama				*	*			*
Guabiroba					*	*		*
Guajuvira	*	*		*	*			*
Guaritá	*	*		*	*	*		*
Ingá	*					*	*	
Ipê-amarelo	*		*	*		*	*	
Ipê-branco	*	*		*	*	*	*	
Ipê-rosa	*	*		*	*	*	*	
Ipê-roxo	*	*		*	*	*	*	
Jacarandá-caroba	*	*		*		*	*	
Jacarandá-da-bahia	*			*		*	*	
Jacarandá-mimoso	*	*		*		*	*	
Jacarandá-rosa	*					*	*	
Jatobá	*	*		*		*		*
Jequitibá-rosa	*	*		*		*		*
Jerivá			*	*		*	*	

ANEXO III - Descrição das espécies selecionadas

Nome Popular	Calçada Ampla (> 3 m)	Canteiro Central Amplo (> 3 m)	Canteiro Central Estreito (< 3 m)	Praças	Embaixo de Fiação	Sem Fiação	Via Extensa	Via Curta
Louro-pardo	*			*	*	*	*	
Manacá-da-serra			*	*	*	*	*	
Melaleuca	*	*		*		*		*
Óleo-copaiba	*			*	*	*	*	
Paineira		*		*		*		*
Palmeira-azul						*		*
Palmeira-carpentaria			*	*		*	*	
Palmeira-elegance			*	*			*	
Palmeira-imperial			*	*			*	
Palmeira-rabo-de-peixe		*		*		*	*	
Palmeira-real-australiana		*		*		*	*	
Pau-brasil		*		*	*	*	*	
Pau-de-mulato	*	*		*		*		*
Pau-ferro		*		*	*	*		*
Peroba	*	*		*		*		*
Pitanga				*	*			*
Quaresmeira	*			*		*	*	
Resedá			*		*	*	*	
Sapuva	*	*		*	*	*	*	
Sibipiruna	*				*	*	*	
Tamareira			*				*	
Tarumã	*	*		*	*	*	*	
Tipuana	*	*		*	*	*	*	
Uvaia				*	*			*